

PROTOCOLLO RIMOZIONE AMALGAME

(rivisto secondo la IAOMT e il Coordinamento Studi Dentistici Biologici)

Queste informazioni non vogliono esprimere diagnosi o terapie

PREMESSA

- 1) NON eseguire la rimozione su donne in gravidanza
- 2) SOLO ablazione MANUALE tartaro sui denti con amalgame o capsule-ponti
- 3) Cercare le amalgame anche sotto i ponti e le capsule di denti devitalizzati (molto probabile in ponti o capsule di 5 o più anni)
- 4) Il linea di massima si dovrebbero usare tutte le precauzioni. L'ossigeno è una garanzia in più qualora il dentista non possa essere SCRUPOLOSO su tutti i DETTAGLI del protocollo (eventualità probabile) e/o se la persona è malata.

PREPARAZIONE: (almeno 1 settimana prima)

- 1) Drenaggio mesenchima e linfatico, integrazione vitaminica-minerale, supporto fito-omeopatico organi deboli. Evacuazione intestinale giornaliera.
Alimentazione povera di carboidrati, latticini e zuccheri. Bere almeno 1 litro di acqua lontano dai pasti.

RIMOZIONE

- 1) 2 capsule di carbone vegetale poco prima dell'appuntamento
- 2) Fresa in Tungsteno (nuova e piccolissima in modo da impattare meno metallo possibile)
- 3) Enucleazione o disincastrazione dell'amalgama con occhialini a lente.
- 4) Diga di gomma montata in modo da COPRIRE IL NASO (e il nasale dell'ossigeno). ASCIUGAMANO SOPRA LA FACCIA DEL PAZIENTE.
- 5) OSSIGENO con nasale. MAI fare respirare dalla bocca il paziente. Cercare una posizione che permetta di respirare con il naso.
- 6) Cuffie e camice usa e getta per il paziente.
- 7) Finestra dello studio aperta e/o ionizzatori-filtri accesi.
- 8) Rimozione di una o più amalgame ma un quadrante per appuntamento.
- 9) Rimozione sequenziale con amalgamometro.
- 10) Doppia aspirazione potenziata con cannule a 180 gradi una dall'altra (meglio se doppio motore o potenziata): **OGNI 5-10 SECONDI CIRCA INTERROMPERE IL FRESAGGIO E ASPIRARE DIETRO DIGA** per evitare che i vapori che passano la diga rimangano intrappolati.
- 11) Quando possibile usare il "clean-up".
- 12) Lubrificazione acqua al massimo.
- 13) Dentista e assistente dovrebbero indossare la mascherina antimercurio.

POST-RIMOZIONE

- 1) Fare la doccia, lavare i vestiti e pulire-lavare il naso e la bocca.
- 2) Sciacqui di 15 min con un cucchiaino di olio di girasole puro 1 volta al dì per qualche giorno. Sciacqui dopo lavaggio denti con fitoterapico antibiotico.